

ΣΚΟΠΟΣ

Παρουσίαση περιστατικού προδιαφραγματικής κυτταρίτιδας κόγχου από Carnocytophaga Sputigena σε έδαφος λοιμώδους μονοπυρήνωσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Νήπιο 5 ετών προσκομίσθηκε λόγω μη υποχώρησης περιοφθαλμικού οιδήματος δεξιού οφθαλμού παρά την λήψη τοπικής αγωγής με χλωραμφαινικόλη/δεξαμεθαζόνη και από του στόματος κεφπροζίλη από διημέρου. Ανέφερε επίσης εμπύρετο και ρινίτιδα. Στην οφθαλμολογική εξέταση διαπιστώθηκε περιοφθαλμικό οίδημα δεξιού οφθαλμού, εξέρυθρο, επώδυνο με συνοδές πυώδεις εκκρίσεις. ΟΟΔΟ 8/10 s.c. ΟΟΑΟ 9/10 s.c. Το πρόσθιο και οπίσθιο ημιμόριο ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα και η οφθαλμοκινητικότητα φυσιολογική. Μετά από τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, τέθηκε η διάγνωση προδιαφραγματικής κυτταρίτιδας κόγχου, ενώ κατά την παιδιατρική εκτίμηση διαγνώστηκε λοιμώδης μονοπυρήνωση και εισήχθη στην Παιδιατρική κλινική. Έγινε αρχικά έναρξη ενδοφλέβιας αγωγής με κεφουροξίμη 100mg/kg και τομπραμυκίνη τοπικά. Λήφθηκε συγχρόνως καλλιέργεια οφθαλμικών εκκρίσεων. Η απάντηση του ασθενούς ήταν μειωμένη και έτσι προστέθηκε από τους παιδιάτρους βανκομυκίνη, που όμως οδήγησε σε αλλεργική αντίδραση και άμεση διακοπή της βανκομυκίνης. Εν τω μεταξύ το αποτέλεσμα της καλλιέργειας των οφθαλμικών εκκρίσεων έδειξε *Carpocytophaga sputigena* και *Staphylococcus aureus*, οπότε βάσει αντιβιογράμματος έγινε προσθήκη κλαρυθρομυκίνης i.v στην αγωγή. Η απάντηση στη νέα αγωγή ήταν άμεση και σταδιακά μέσα σε δύο εβδομάδες είχαμε πλήρη βελτίωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

- Τα *Carnocytophaga Sputigena* είναι gram αρνητικά αναερόβια βακτήρια που ανήκουν στην φυσιολογική χλωρίδα του ανθρώπινου στόματος. Η οφθαλμική λοίμωξη που οφείλεται σε αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια. Καθώς όμως έχει περιγραφεί περιστατικό σε παιδί πολύ σοβαρής κυτταρίτιδας κόγχου με συνοδό περιοστικό απόστημα από το *C. Sputigena*, η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπισή του είναι εξαιρετικής σημασίας.